

welk

CLL

# Ihre Therapie mit Venclyxto

Das Wichtigste in Kürze

 VENCLYXTO®

abbvie  
care   
with you

# Was ist Venclyxto?


**Gemeinsam mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt haben Sie sich für die Therapie der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) mit Venclyxto entschieden. Die Einnahme erfolgt täglich als Tablette. Venclyxto wird allein oder in Kombination mit einem anderen Medikament angewandt. Welche der beiden Behandlungsformen für Sie die beste ist, weiß Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt.**

## Die Wirkung von Venclyxto

Venclyxto wirkt, indem es den Eiweißstoff BCL-2 im Körper hemmt. BCL-2 hilft den Krebszellen zu überleben. Seine Hemmung trägt dazu bei, dass Krebszellen absterben und somit insgesamt weniger von ihnen vorhanden sind.

## Die Aufdosierungsphase

Da Krebszellen sehr sensibel auf Venclyxto reagieren, starten Sie Ihre Therapie mit einer Aufdosierungsphase: In den ersten fünf Wochen der Behandlung wird die Wirkstoffmenge wöchentlich erhöht. Nach Erreichen der Standarddosis von 400 mg pro Tag wird Venclyxto in dieser Dosis weiter eingenommen. Bei Bedarf passt Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt die Dosis jeweils an. Für jede Dosierung erhalten Sie eine Tablettenpackung mit der passenden Wirkstoffmenge. Die Tabletten sehen unterschiedlich aus, damit die verschiedenen Dosierungen leichter erkannt werden können.

<b>Woche 1</b>	1x täglich 20 mg	
<b>Woche 2</b>	1x täglich 50 mg	
<b>Woche 3</b>	1x täglich 100 mg	
<b>Woche 4</b>	1x täglich 200 mg	
<b>Ab Woche 5</b>	1x täglich 400 mg	

## Wichtig vor Therapiebeginn

Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt wird mit Ihnen den genauen Ablauf der Aufdosierungsphase besprechen. Sie bzw. er wird Sie in diesem Zeitraum engmaschig betreuen und mögliche Fragen vor und während der Therapie beantworten.

Informieren Sie Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt über weitere Medikamente, die Sie einnehmen, da diese die Wirkung von Venclyxto beeinflussen können. Das betrifft auch frei verkäufliche Arznei- oder Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke oder dem Drogeriemarkt, etwa Präparate, die Johanniskraut enthalten.



## Ausreichend trinken!

Während der Aufdosierungsphase kann es zu einer hohen Konzentration von Abbauprodukten der Krebszellen im Blut kommen. Dadurch kann ein sogenanntes Tumorlysesyndrom (TLS) ausgelöst werden. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr erleichtert es dem Körper, die Abbauprodukte auszuscheiden, und hilft, ein TLS zu vermeiden. Daher ist es entscheidend, dass Sie ab zwei Tage vor und während der gesamten Aufdosierungsphase ausreichend trinken. Trinken Sie täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser oder andere alkohol- und koffeinfreie Getränke.



Nutzen Sie auch den praktischen, kostenfreien Therapiebegleiter, um sich mit Ihrer Venclyxto-Therapie vertraut zu machen. Diesen und noch mehr Wissenswertes zu Ihrer Behandlung sowie



Infomaterial zum Bestellen und zum Download erhalten Sie unter:

[www.abbvie-care.de/cll-info](http://www.abbvie-care.de/cll-info)

# Wichtige Hinweise für die Therapie mit Venclyxto



## Nehmen Sie Venclyxto exakt nach ärztlicher Absprache ein:

Nehmen Sie die Tabletten täglich jeweils morgens ungefähr zur gleichen Zeit im Ganzen mit Wasser bei einer Mahlzeit ein. Sollten Sie die Einnahme vergessen haben, wenden Sie sich an Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt und lassen Sie sich beraten, wie Sie die Therapie fortsetzen sollen.



## Trinken Sie ausreichend:

Trinken Sie jeden Tag mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser. Beginnen Sie zwei Tage vor der ersten Einnahme und behalten Sie die Trinkmenge während der gesamten Aufdosierungsphase bei.



## Achten Sie auf Ihr Essen:

Verzichten Sie während der Behandlung mit Venclyxto auf den Verzehr von Grapefruits, Bitterorangen und Sternfrüchten (Karambola) sowie auf Produkte, die sie enthalten. Die Inhaltsstoffe dieser Früchte können die Konzentration von Venclyxto im Blut verändern.



## Verpassen Sie keine Kontrolluntersuchung:

Halten Sie alle Ihre Termine für Blutuntersuchungen oder Labortests ein.



## Vermeiden Sie Wechselwirkungen:

Einige Medikamente, die zu den sogenannten **CYP3A-Inhibitoren** zählen, dürfen zu Beginn und während der Aufdosierungsphase nicht eingenommen werden: bestimmte Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, gegen bakterielle Infektionen (Antibiotika) und gegen eine HIV-Infektion. Stimmen Sie sich hierzu mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt ab. Sie dürfen Venclyxto ebenfalls nicht nehmen, wenn Sie das pflanzliche Arzneimittel **Johanniskraut** einnehmen.



Diesen Flyer erhalten Sie in Englisch,  
Polnisch, Russisch und Türkisch unter:  
[www.abbvie-care.de/cil-flyer](http://www.abbvie-care.de/cil-flyer)

[www.abbvie-care.de/venclyxto/cil](http://www.abbvie-care.de/venclyxto/cil)