

with

CLL (ХЛЛ)

Ваше лечение препаратом Венкликсто

Вкратце о самом важном

 VENCLYXTO®

abbvie
care 
with you

Что такое Венкликсто?






Вместе с вашим лечащим врачом вы решили лечить хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ) препаратом Венкликсто. Препарат принимают ежедневно в виде таблетки. Венкликсто применяют в качестве монотерапии или в комбинации с другим препаратом. Ваш врач знает, какой из двух видов лечения лучше всего подходит для вас.

Действие препарата Венкликсто

Действие препарата Венкликсто заключается в ингибировании белка BCL-2 в организме. BCL-2 помогает раковым клеткам выживать. Его ингибирование способствует гибели раковых клеток, в результате чего их количество уменьшается.

Фаза постепенного повышения дозы

Поскольку раковые клетки очень чувствительно реагируют на препарат Венкликсто, начните терапию с фазы постепенного повышения дозы: В первые пять недель лечения количество действующего вещества повышают еженедельно. После достижения стандартной дозы 400 мг в день прием препарата Венкликсто продолжается в этой дозе. При необходимости ваш врач скорректирует дозу соответствующим образом. Вы получите упаковку с таблетками, содержащими необходимое количество действующего вещества для каждого приема. Таблетки выглядят по-разному, чтобы было легче распознать разные дозировки.

Неделя 1	20 мг один раз в день	
Неделя 2	50 мг один раз в день	
Неделя 3	100 мг один раз в день	
Неделя 4	200 мг один раз в день	
С недели 5	400 мг один раз в день	

Что важно знать перед началом терапии

Ваш врач обсудит с вами точную продолжительность фазы постепенного повышения дозы. В течение этого периода врач будет внимательно наблюдать за вашим состоянием и отвечать на любые вопросы, которые могут возникнуть у вас до и во время терапии. Сообщите врачу о других лекарственных препаратах, которые вы принимаете, поскольку они могут повлиять на действие препарата Венкликсто. Это также касается безрецептурных препаратов или диетических добавок, продающихся в аптеке или в аптечном киоске, например, препаратов, содержащих зверобой.



Употребляйте достаточное количество жидкости!

Во время фазы постепенного повышения дозы в крови может наблюдаться высокая концентрация продуктов распада раковых клеток. Это может вызвать так называемый синдром лизиса опухоли (СЛО).

Достаточное потребление жидкости облегчает выведение продуктов распада из организма и помогает избежать СЛО.

Поэтому очень важно употреблять достаточное количество жидкости за два дня до начала и в течение всей фазы постепенного повышения дозы. Выпивайте не менее 1,5-2 литров воды или других безалкогольных и не содержащих кофеин напитков каждый день.



Вы также можете воспользоваться бесплатным практическим руководством по терапии, чтобы ознакомиться с лечением препаратом Венкликсто. Эту и другую полезную информацию о вашем лечении, а также



информационные материалы для заказа и скачивания вы можете найти на сайте:

www.abbvie-care.de/cll-info

Важные указания по терапии препаратом Венкликсто



Принимайте препарат Венкликсто в соответствии с предписаниями врача:

Принимайте таблетки целиком, запивая водой, примерно в одно и то же время каждое утро во время еды. Если вы забыли принять дозу, обратитесь к своему врачу и проконсультируйтесь о том, как следует продолжать терапию.



Употребляйте достаточное количество жидкости:

Впивайте не менее 1,5-2 литров воды каждый день. Начните за два дня до первого приема и поддерживайте количество потребляемой жидкости на протяжении всей фазы повышения дозы.



Следите за своим питанием:

Во время лечения препаратом Венкликсто избегайте употребления грейпфрутов, горьких апельсинов, звездного фрукта (карамболы), а также продуктов, которые их содержат. Ингредиенты, содержащиеся в этих фруктах, могут изменять концентрацию препарата Венкликсто в крови.



Не пропускайте контрольные обследования:

Придерживайтесь всех назначенных вам сроков сдачи анализов крови или лабораторных тестов.



Избегайте взаимодействия:

Некоторые препараты, являющиеся **ингибиторами СYP3A**, нельзя принимать в начале и во время фазы постепенного повышения дозы: некоторые действующие вещества против грибковых инфекций, против бактериальных инфекций (антибиотики) и против ВИЧ-инфекции. Обсудите это с вашим врачом. Вам также нельзя принимать препарат Венкликсто, если вы принимаете травяной препарат **зверобой**.



Этот буклет доступен на английском, польском, русском и турецком языках:
www.abbvie-care.de/cil-flyer

www.abbvie-care.de/venclyxto/cil

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Mainzer Straße 81 | 65189 Wiesbaden