

with

KLL

Venclyxto ile tedaviniz

Kısa bilgiler

 VENCLYXTO®

abbvie
care 
with you

Venclyxto nedir?

Doktorunuzla birlikte kronik lenfositik lösemi (KLL) Venclyxto ile tedavi etmeye karar verdiniz. Günde bir tablet olarak alınır. Venclyxto tek başına veya başka bir ilaçla birlikte kullanılabilir. Doktorunuz iki tedavi yönteminden hangisinin sizin için en iyi olduğunu bilir.

Venclyxto'nun etkisi

Venclyxto vücuttaki BCL-2 proteinini inhibe ederek çalışır. BCL-2 kanser hücrelerinin hayatta kalmasına yardımcı olur. İnhibisyonu kanser hücrelerinin ölmesine katkıda bulunur ve bu nedenle genel olarak daha azı bulunur.

Doz-eskalasyon evresi

Kanser hücreleri Venclyxto'ya karşı çok hassas olduğu için tedavinize bir doz yükseltme aşaması ile başlayın: Tedavinin ilk beş haftasında aktif bileşen miktarı haftalık olarak arttırılır. Günde 400 mg'lık standart doza ulaştıktan sonra Venclyxto bu dozu almaya devam edecektir. Gerekirse doktorunuz dozu uygun şekilde ayarlayacaktır. Her doz için uygun miktarda aktif bileşen içeren bir tablet paketi alacaksınız. Tabletler farklı görünür, böylece farklı dozajlar daha kolay tanımlanabilir.

1. hafta	günde bir kez 20 mg	
2. hafta	günde bir kez 50 mg	
3. hafta	günde bir kez 100 mg	
4. hafta	günde bir kez 200 mg	 
5. haftadan itibaren	günde bir kez 400 mg	   

Tedaviye başlamadan önce önemli:

Doktorunuz doz artırma aşamasının tam prosedürünü size anlatacaktır. Bu süre zarfında, sizi yakından denetleyecek ve tedavi öncesi ve sırasında aklınıza gelebilecek tüm soruları cevaplayacaktır.

Venclyxto'nun etkisini etkileyebileceği için aldığınız diğer ilaçlar hakkında doktorunuzu bilgilendirin. Sarı kantaron içeren preparatlar gibi eczaneden alınan reçetesiz ilaçlar veya diyet takviyeleri için de geçerlidir.



Yeterli miktarda sıvı tüketin!

Dozlama aşamasında, kanda kanser hücrelerinin metabolik atıkların yüksek konsantrasyonu olabilir. Bu durum tümör lizis sendromu (TLS) olarak bilinen durumu tetikleyebilir.

Yeterli sıvı alımı vücudun metabolik atıkları atmasını kolaylaştırır ve TLS'nin önlenmesine yardımcı olur.

Bu nedenle, tüm dozlama aşaması boyunca ve iki gün öncesinden itibaren yeterince su içmek çok önemlidir. Günlük en az 1,5 ila 2 litre su veya diğer alkol ve kafeinsiz içecekler tüketin.



Venclyxto tedavisine aşına olmanız için pratik, ücretsiz tedavi kılavuzunu da kullanabilirsiniz. Bu ve tedaviniz hakkında daha ilginç gerçekler ve



sipariş ve indirilecek bilgi materyali şu adreste mevcuttur:

www.abbvie-care.de/cll-info

Venclyxto tedavisi için önemli notlar



Venclyxto'yu tam olarak doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde alın:

Tabletleri her sabah yaklaşık olarak aynı saatte tamamen suyla birlikte bir öğün ile alın. Almayı unutursanız, doktorunuza başvurun ve tedavinize nasıl devam edeceğiniz konusunda tavsiye isteyin.



Yeterli miktarda sıvı tüketin:

Her gün en az 1,5 ila 2 litre su için. İlk dozdan iki gün önce başlayın ve dozaj aşaması boyunca içmeye devam edin.



Yediklerinize dikkat edin:

Venclyxto alırken greycfurt, acı portakal ve yıldız meyveleri (carambola) ve bunları içeren ürünleri yemekten kaçınin. Bu meyvelerdeki bileşenler kandaki Venclyxto konsantrasyonunu değiştirebilir.



Kontrol muayenesini atlamayın:

Kan testleri veya laboratuvar testleri için tüm randevularınızı ayarlayın.



Etkileşimlerden kaçınin:

CYP3A inhibitörü olan bazı ilaçlar başlangıçta ve tamamlama aşamasında alınmamalıdır: mantar enfeksiyonlarına karşı, bakteriyel enfeksiyonlara karşı (antibiyotikler) ve HIV enfeksiyonuna karşı bazı aktif maddeler. Bu konuda doktorunuzla görüşün. Ayrıca sarı kantaron bitkisel ilacını kullanıyorsanız Venclyxto almamalısınız.



Bu kitapçığı İngilizce, Lehçe, Rusça ve Türkçe dillerinde okumak için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:

www.abbvie-care.de/cil-flyer

www.abbvie-care.de/venclyxto/cil

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Mainzer Straße 81 | 65189 Wiesbaden